protocol d'

ACTUACIÓ AMB EL DEA

ASME

PROTOCOL D'
ACTUACIÓ AMB EL DEA

1. COM FER SERVIR EL DEA

1. Detecta l'emergència:

- Si observes que una persona presenta signes de parada cardíaca (pèrdua de consciència, absència de respiració o pols), mantingues la calma i alerta immediatament el personal proper. Recorda que actuar ràpidament pot salvar vides.

2. Activa el protocol d'emergència:

- Demana que algú truqui al 112 indicant clarament la situació i la ubicació exacta del centre. Mentre arriba ajuda externa, prepara't per utilitzar el DEA.

3. Accedeix al DEA:

- El DEA es troba a la recepció del centre. Dirigeix-t'hi amb rapidesa, agafa el dispositiu i porta'l al lloc de l'emergència. No cal preocupar-se: el DEA guia pas a pas amb indicacions visuals i sonores.

4. Segueix les instruccions del DEA:

- Col·loca les plaques adhesives segons les indicacions i deixa que el dispositiu analitzi el ritme cardíac. El DEA t'indicarà si cal aplicar un xoc o continuar amb les maniobres de reanimació.

5. Mantingues la calma i continua l'actuació:

- Encara que arribin altres persones a ajudar, mantingues el control i segueix les instruccions del DEA i del protocol de RCP. La seguretat i la confiança són claus en aquests moments.

6. Finalitza l'actuació i informa:

- Un cop arribi el servei d'emergències i la persona estigui sota la seva atenció, informa detalladament del que ha passat i del temps que ha estat utilitzat el DEA. Posteriorment, entrega el DEA a recepció perquè el dispositiu sigui revisat i preparat per a futures emergències.

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Suport Vital Bàsic amb ús d'un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA)

Consejo Español

CCR Consell Català de Ressuscitació

Comprovi la resposta

- Sacsegi amb cura
- Pregunti amb veu forta: "Es troba bé?

Si no respon

- Obri la via aèria i comprovi la respiració

Si no respon i no respira amb normalitat

- Telefonar 112, enviï algú a buscar un DEA

si respira amb normalitat

Col·loqui'l en la posició de recuperació

- Telefonar 112
- Continuï valorant que la respiració segueix essent normal

Inicïi compressions toràciques immediatament

- Col·loqui les seves mans al centre del pit
- Administri 30 compressions toràciques:
  - Premi amb fermesa almenys 5 cm, però no més de 6 cm de profunditat
  - Premi a una freqüència d'almenys 100/min, però no més de 120/min
- Si està entrenat i és capaç, combini compressions toràciques amb ventilacions. Altrament, continuï RCP només amb compressions
  - Col·loqui els seus llavis al voltant de la boca
  - Insuflí constantment fins elevar el pit
  - Doni una nova respiració quan el pit es deprimeixi
- Continuï RCP 30 compressions i 2 ventilacions

Tan aviat com arribi el DEA Posi'l en marxa i col·loqui pegats

- Segueixi les instruccions verbals/visuals
- Col·loqui un pegat sota l'aixella esquerra
- Col·loqui l'altre pegat sota la clavícula dreta, a prop de l'estèrnum
- Si hi ha més d'un reanimador: no interrompi la RCP

Si està indicada la descàrrega

- Allunyis i administri la descàrrega
- Continuï RCP

Segueixi les instruccions del DEA

Continuï RCP a menys que estigui segur que la víctima s'ha recuperat i comença a respirar amb normalitat