

PROTOCOL PA
COL PROTOCO
OTOCOL PROT
L PROTOCOL P

protocol d'
ACTUACIÓ AMB EL DEA
ASME

PROTOCOL D' ACTUACIÓ AMB EL DEA

1. COM FER SERVIR EL DEA

1. Detecta l'emergència:

- Si observes que una persona presenta signes de parada cardíaca (pèrdua de consciència, absència de respiració o pols), mantingues la calma i alerta immediatament el personal proper. Recorda que actuar ràpidament pot salvar vides.

2. Activa el protocol d'emergència:

- Demana que algú truqui al 112 indicant clarament la situació i la ubicació exacta del centre. Mentre arriba ajuda externa, prepara't per utilitzar el DEA.

3. Accedeix al DEA:

- El DEA es troba a la recepció del centre. Dirigeix-t'hi amb rapidesa, agafa el dispositiu i porta'l al lloc de l'emergència. No cal preocupar-se: el DEA guia pas a pas amb indicacions visuals i sonores.

4. Segueix les instruccions del DEA:

- Col·loca les plaques adhesives segons les indicacions i deixa que el dispositiu analitzi el ritme cardíac. El DEA t'indicarà si cal aplicar un xoc o continuar amb les maniobres de reanimació.

5. Mantingues la calma i continua l'actuació:

- Encara que arribin altres persones a ajudar, mantingues el control i segueix les instruccions del DEA i del protocol de RCP. La seguretat i la confiança són claus en aquests moments.

6. Finalitza l'actuació i informa:

- Un cop arribi el servei d'emergències i la persona estigui sota la seva atenció, informa detalladament del que ha passat i del temps que ha estat utilitzat el DEA. Posteriorment, entrega el DEA a recepció perquè el dispositiu sigui revisat i preparat per a futures emergències.



Suport Vital Bàsic amb ús d'un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA)

